



ВЕТФАРМ



Ріфмокс

Флоріф

Ріфкокс

# РІФМОКС

**Водорозчинний порошок  
для перорального застосування**

## Склад:

1 г препарату містить діючу речовину:  
амоксациліну тригідрат – 500 мг.



## Застосування

Лікування телят, ягнят та козенят, віком до 3 місяців, свійської птиці (курчат, бройлерів, ремонтного молодняка, племінних курей, індиків) та свиней при захворюваннях травного каналу, органів дихання та сечостатевої системи, шкіри та м'яких тканин, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.

## Дозування

Перорально з кормом або питною водою у дозах для свиней:

Дози	Свині масою 10-20 кг	Свині масою 21-40 кг	Свині масою 41-60 кг	Свині масою 61-80 кг	Свині масою 81-100 кг	Свиноматки до та після опоросу	Лактуючі свиноматки	Кнури
Щоденна норма питної води	1-2 л	2-4 л	4-5 л	5-6 л	6-7 л	7-8 л	15-20 л	7-8 л
Доза препарату (г на 1000 л питної води)	300 г	300 г	325 г	375 г	400 г	510 г	235 г	585 г
Щоденна норма корму	0,7 кг	1,4 кг	2,2 кг	2,7 кг	3,0 кг	3,2 кг	5,5 кг	3,0 кг
Доза препарату (г на 1 тону корму)	625 г	625 г	675 г	750 г	850 г	1200 г	745 г	1460 г

курс лікування 3-5 днів

Свійська птиця (курчата, бройлери, ремонтний молодняк, племінні кури, індики):

Дози	Свійська птиця віком до 2 тижнів	Свійська птиця віком 15-28 днів	Свійська птиця віком 29-35 днів
Доза препарату (г на 1000 л питної води)	210 г	415 г	500 г
Доза препарату (г на 1 тону корму)	830 г	300 г	1000 г

курс лікування 3-5 днів

Телята, ягнята, козенята, віком до 3 місяців: 20 мг амоксициліну на 1 кг маси тіла двічі на добу або 1-4 г препарату на голову, двічі на добу протягом 5 днів.

# ФЛОРИФ 25

**Розчин для перорального застосування**

## Склад:

1 мл препарату містить діючу речовину:  
флуорфенікол - 25 мг.



## Застосування

Кури (бройлери, ремонтний молодняк, племінна птиця), індики: лікування птиці, хворої на колісептицемію, пастерельоз, стафілококоз, а також при захворюваннях органів дихання та вторинних бактеріальних інфекціях, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.

Свині: лікування тварин, хворих на плевропневмонію (що спричинена *Actinobacillus pleuropneumoniae*), атрофічний риніт (що викликаний *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*); Гласерову хворобу, гемофільоз (що спричинений *Haemophilus parasuis*), мікоплазмоз та інші хвороби, що викликані мікроорганізмами, чутливими до флуорфеніколу.

## Дозування

Перорально з питною водою у дозах:

Свині – 15-20 мг флуорфеніколу на 1 кг маси тіла (0,6-0,8 мл препарату на 1 кг маси тіла). Курс лікування 5-7 днів;

Кури-бройлери, племінна птиця, ремонтний молодняк птиці, індики - 20 мг флуорфеніколу на 1 кг маси тіла (0,8 мл препарату на 1 кг маси тіла) або 400 мл препарату на 100 л води. Курс лікування 3-5 днів.

Вода з препаратом повинна бути єдиним джерелом питної води протягом усього періоду лікування! Розчин готувати з розрахунку добової потреби птиці у воді.



# РІФКОКС 5%

*Суспензія для перорального застосування*

## Склад:

1 мл препарату містить діючу речовину:  
толтразурил - 50 мг.



## Застосування

Лікування та профілактика великої рогатої худоби (телят) і свиней (поросят до 9-ти місячного віку) при еймеріозах та ізоспорозі: у поросят, викликаних: *Eimeria scabra*, *E. guevarai*, *Isoospora suis*; у телят, викликаних: *Eimeria bovis*, *E. zuernii*, *E. alabamensis*.

## Дозування

Вводиться перорально індивідуально кожній тварині за допомогою спеціального дозатора. Перед застосуванням суспензію слід ретельно збовтати.

Поросята - одноразово на 3-5 добу життя у дозі: 20 мг толтразурилу/кг маси тіла, що еквівалентно 0,4 мл препарату/кг маси тіла тварини, але не менше 0,5 мл і не більше 2 мл на тварину;

Телята - одноразово з 2-х тижневого віку у дозі: 15 мг толтразурилу/кг маси тіла, що еквівалентно 3 мл препарату на 10 кг маси тіла.

У неблагополучних по еймеріозу господарствах для досягнення максимального профілактичного ефекту і зниження виділення кількості ооцист у зовнішнє середовище препарат рекомендують застосовувати тваринам до появи клінічних ознак захворювання.

