



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 06.07.2016 № 2689-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 18.07.2016 р. № 203 зареєстровано:

препарат

КОКСУРІЛ

форма

Розчин для перорального застосування

Власник реєстраційного посвідчення:

Монтажат Ветеринарі Фармасьютікалс Ко. Лтд.

2^{мі} Індастріал Сіті, П.О. Бокс 4248, Даммам 31491 , Королівство Саудівська Аравія

зареєстровано в Україні за №

АА-06356-01-16

від

18.07.2016

Виробник:

Монтажат Ветеринарі Фармасьютікалс Ко. Лтд.

2^{мі} Індастріал Сіті, П.О. Бокс 4248, Даммам 31491 , Королівство Саудівська Аравія

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.


Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2)
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

17.07.2021

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату



В.о. директора Департаменту безпеки харчових продуктів та ветеринарії
Acting Director of Department for Food Safety and Veterinary

M.V. Bilouc
М.В. Білоус

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Державний науково-дослідний контрольний
інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок

Національне агентство ветеринарних
препаратів та кормових добавок

79019, м. Львів, вул. Донецька, 11
тел.: (032) 252-82-84; факс: (032) 252-11-93
www.scivp.lviv.ua e-mail: NAVPFA@ukr.net



MINISTRY OF AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE

State scientific-research control institute
of veterinary medicinal products
and feed additives

National agency of veterinary medicinal
products and feed additives

Donetska str.,11, Lviv 79019, Ukraine
tel.: (380 32) 252-82-84; fax: (380 32) 252-11-93
www.scivp.lviv.ua e-mail: NAVPFA@ukr.net

06.07.2016 № 2689-К/06

Голові Держпродспоживслужби України
Лані В.І.

ТОВ «Агровет Україна»,
за дорученням
Монтажат Ветеринарі Фармасьютікалс
Ко. Лтд. (Королівство Саудівська Аравія)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами наукової експертизи реєстраційного досьє та аналітичних випробувань
препарату/продукту
КОКСУРІЛ

власник Монтажат Ветеринарі Фармасьютікалс Ко. Лтд. (Королівство Саудівська Аравія)
виробник Монтажат Ветеринарі Фармасьютікалс Ко. Лтд. (Королівство Саудівська
Аравія)

згідно з контрактом № 98 від 18.03.2015 р.

За результатами проведеної наукової експертизи реєстраційного досьє та
випробувань препарату/продукту КОКСУРІЛ, розчин для перорального застосування,
власник Монтажат Ветеринарі Фармасьютікалс Ко. Лтд. (Королівство Саудівська Аравія),
виробник Монтажат Ветеринарі Фармасьютікалс Ко. Лтд. (Королівство Саудівська
Аравія) рекомендовано його реєстрацію в Україні.

Реєстраційне посвідчення: АА-06356-01-16

Директор Інституту,
д.в.н., професор,
членкор. НААН

І.Я. Коцюмбас

Голова Агентства, д.б.н.

Ю.М. Косенко

Виконавець:
Везденко О.С. (032) 252-82-84

Коротка характеристика препарату

1. Назва

КОКСУРІЛ

2. Склад

Один мілілітр препарату містить діючу речовину:
толтразурил – 25мг.

3. Фармацевтична форма

Розчин для перорального застосування.

4. Фармакологічні властивості

Дослідження за допомогою оптичної та електронної мікроскопії показали, що толтразурил є ефективним проти всіх внутрішньоклітинних стадій кокцидіозу, включаючи шизонти, мікро та макрогамонти. Він перешкоджає поділу протозойного ядра, активності мітохондрій і руйнує стінки, які формують тіла мікрогамет. Толтразурил виробляє сильну вакуолізацію протозойної ендоплазматичної сітки на всіх стадіях внутрішньоклітинного розвитку.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Птиця, велика рогата худоба, вівці, кози, кролі та свині.

5.2 Показання до застосування

Профілактика і лікування птиці, телят, ягнят, козенят, кролів та поросят при кокцидіозах, спричинених різними видами еймерій: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. Mitis*, *E. adenoides*, *E. meleagriditis*, *Isospora suis*, *Eimeria arloingi*, *E. scarab*, *E. guevarai*, *E. bovis*, *E. zuernii*, *E. alabamensis*

5.3 Протипоказання

Не застосовувати курам-несучкам, яйця яких застосовуються в їжу людям.

Не застосовувати великій рогатій худобі старше 9 місяців.

Не застосовувати тваринам, що знаходяться на відгодівлі.

5.4 Побічна дія

Не вказано.

5.5 Особливі застереження при використанні

Забій тварин на м'ясо дозволяється: телята через 63 доби; поросята, козенята, ягнята та кролі через 77 діб; птиця через 14 діб.

Отримане, до зазначеного терміну м'ясо утилізують, або згодують непродуктивним тваринам, залежно від висновку ветлікаря.

5.6 Використання під час вагітності, лактації несучості

Не застосовувати курам-несучкам, яйця яких застосовуються в їжу людям.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не вказано.

5.8 Дози та способи введення тваринам різного віку

Птиця: (кури та індики):

лікування: 1 мл Коксурілу на 1 л питної води на добу безперервно протягом 48 годин, або 3 мл/л питної води, 8 год/добу протягом 2 діб.

Телята: вводять один раз у дозі 6 мл Коксурілу на 10 кг м.т. – перорально.

Козенята та ягнята:

лікування: 8 мл Коксурілу на 5 кг м.т., змішаного з водою чи молоком, один раз на добу, протягом двох діб.

Профілактика: одноразово у дозі 4 мл Коксурілу на 5 кг м.т., змішаного з водою чи молоком.

Кролі: 1 мл Коксурілу на 1 л питної води) безперервно протягом 2 діб. Повторити лікування через 5 діб.

Голуби: 20 мг/кг м.т. протягом доби. Лікування повторювати кожні 30 днів.

Поросята на 3-5 добу життя: 0,4 мл/кг м.т.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не вказано.

5.10 Спеціальні застереження

Не вказано.

5.11. Період виведення (каренції)

Забій тварин на м'ясо дозволяється: телята через 63 доби; поросята, козенята, ягнята та кролі через 77 діб; птиця через 14 діб.

5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності

Не вказано.

6.2 Термін придатності

Три роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Сухе, захищене від світла місце при температурі нижче 5-30 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Поліетиленові флакони по 1000 та 5000 мл.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат утилізувати.

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника

Монтажат Ветеринарі Фармасьютікалс Ко. Лтд.
2nd Індастріал Сіті, П.О. Бокс 4248,
Даммам 31491,
Королівство Саудівська Аравія

Montajat Veterinary Pharmaceuticals Co. Ltd.
2nd Industrial City, P.O. Box 4248,
Dammam 31491,
Kingdom of Saudi Arabia.

КОКСУРІЛ
(розчин для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Розчин для перорального застосування.

Склад

Один мілілітр препарату містить діючу речовину:
толтразурил – 25мг.

Фармакологічні властивості

Дослідження за допомогою оптичної та електронної мікроскопії показали, що толтразурил є ефективним проти всіх внутрішньоклітинних стадій кокцидіозу, включаючи шизонти, мікро та макрогамонти. Він перешкоджає поділу протозойного ядра, активності мітохондрій і руйнує стінки, які формують тіла мікрогамет. Толтразурил виробляє сильну вакуолізацію протозойної ендоплазматичної сітки на всіх стадіях внутрішньоклітинного розвитку.

Застосування

Профілактика і лікування птиці, телят, ягнят, козенят, кролів та поросят при кокцидіозах, спричинених різними видами еймерій: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. Mitis*, *E. adenoides*, *E. meleagrimitis*, *Isoospora suis*, *Eimeria arloingi*, *E. scarab*, *E. guevarai*, *E. bovis*, *E. zuernii*, *E. alabamensis*

Дозування

Птиця: (кури та індики):

лікування: 1 мл Коксурілу на 1 л питної води на добу безперервно протягом 48 годин, або 3 мл/л питної води, 8 год/добу протягом 2 діб.

Телята: вводять один раз у дозі 6 мл Коксурілу на 10 кг м.т. – перорально.

Козенята та ягнята:

лікування: 8 мл Коксурілу на 5 кг м.т., змішаного з водою чи молоком, один раз на добу, протягом двох діб.

Профілактика: одноразово у дозі 4 мл Коксурілу на 5 кг м.т., змішаного з водою чи молоком.

Кролі: 1 мл Коксурілу на 1 л питної води) безперервно протягом 2 діб. Повторити лікування через 5 діб.

Голуби: 20 мг/кг м.т. протягом доби. Лікування повторювати кожні 30 днів.

Поросята на 3-5 добу життя: 0,4 мл/кг м.т.

Протипоказання

Не застосовувати курам-несучкам, яйця яких застосовуються в їжу людям.

Не застосовувати великій рогатій худобі старше 9 місяців.

Не застосовувати тваринам, що знаходяться на відгодівлі.

Застереження

Забій тварин на м'ясо дозволяється: телята через 63 доби; поросята, козенята, ягнята та кролі через 77 діб; птиця через 14 діб.

Форма випуску

Поліетиленові флакони по 1000 та 5000 мл.

Зберігання

Сухе, захищене від світла місце при температурі нижче 5-30 °С.

Термін придатності - три роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника

Монтажат Ветеринарі Фармасьютікалс Ко. Лтд.
2nd Індастріал Сіті, П.О. Бокс 4248,
Даммам 31491,
Королівство Саудівська Аравія

Montajat Veterinary Pharmaceuticals Co. Ltd.
2nd Industrial City, P.O. Box 4248,
Dammam 31491,
Kingdom of Saudi Arabia.

